

The Comparison Effect of Preoperative Ondansetron and Metoclopramide in Reducing Nausea and Vomiting after Laparoscopic Cholecystectomy

Entezariasl M¹, Isazadehfar Kh*², Noorani Z³

¹ Departmmt of Anesthesiology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

² School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

³General Practitioner, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

*Corresponding Author. Tel:+989143511072 Fax:+984512232361 E-mail:isazadehfar@yahoo.com

Received: 2 Nov 2012 Accepted: 18 May 2013

ABSTRACT

Background & Objectives: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is one of the most common complications of anesthesia and without prophylactic intervention occurs in about one-third of patients under general anesthesia. The aim of this study was to compare the efficacy of ondansetron and metoclopramide in reducing PONV after laparoscopic cholecystectomy.

Methods: In this study, 90 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy were randomly allocated into three equal groups ($n=30$) and in the first group 10 mg metoclopramide, in the second group 4 mg ondansetron and for placebo group 2 cc normal saline preoperatively were injected. Anesthesia complications in recovery and nausea and vomiting in recovery and 6 hours and 24 hours after surgery were evaluated. Data were analyzed by SPSS software with chi-square test and analysis of variance (ANOVA). $P<0.05$ was considered significant.

Results: The incidence of nausea in placebo group was 66.7 %, in metoclopramide group was 43.3 % and in ondansetron group was 33.3 %. The difference only between placebo and ondansetron groups was significant ($p=0.019$). The incidence of vomiting in placebo group was 56.7%, in metoclopramide group was 20% and in ondansetron group was 26.7% and there was significant difference between placebo and ondansetron groups ($p=0.035$) and between placebo and metoclopramide groups ($p=0.007$), whereas there was not any significant difference between intervention groups ($p=0.12$). Also anti-emetic drug administration in ondansetron group (40%) in comparison with metoclopramide (63.3%) and placebo (66.7%) was lower, but this difference was not statistically significant ($p= 0.07$).

Conclusion: For prevention of vomiting after laparoscopic cholecystectomy, both metoclopramide and ondansetron are effective. In comparing these two drugs, in preventing of nausea ondansetron is more effective than metoclopramide, whereas there was not any significant difference between two drugs in preventing of vomiting.

Key words: Ondansetron; Metoclopramide; Laparoscopic Cholecystectomy; PONV

مقایسه اثر تجویز قبل از عمل اندانسترون و متولوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کوله سیستکتومی با لپاراسکوپی

مسعود انتظاری اصل^۱، خاطره عیسی زاده فر^{۲*}، زهرانورانی^۳

^۱ گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
^۲ گروه بیهوشی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
^۳ پژوهشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

* نویسنده مسئول. تلفن: ۰۹۱۴۳۵۱۱۰۷۲. فاکس: ۰۹۱۲۲۳۳۶۱. پست الکترونیک: isazadehfar@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: تهوع و استفراغ بعد از عوارض عمده بعد از بیهوشی عمومی بوده و بدون مداخله پیشگیرانه در حدود یک سوم بیماران تحت بیهوشی عمومی رخ می‌دهد. هدف از این تحقیق مقایسه اثر اندانسترون و متولوپرامید در کاهش تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی لپاروسکوپیک بود.

روش کار: در این مطالعه ۹۰ بیمار تحت جراحی کله سیستکتومی لپاراسکوپیک بصورت تصادفی در سه گروه ۳۰ نفره تقسیم و برای گروه اول ۱۰ mg متولوپرامید، گروه دوم ۴ mg اندانسترون و گروه کنترل ۲۰ نرمال سالین قبل از شروع بیهوشی تزریق شد. پس از خاتمه جراحی، بیماران از نظر عوارض بیهوشی در ریکاوری، تهوع و استفراغ در ریکاوری و در ۶ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها توسط نرم‌افزار spss18 مورد پردازش قرار گرفته و با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار P کمتر از ۰/۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها : میزان بروز کلی تهوع در گروه پلاسیو ۷/۶۶٪، در گروه متولوپرامید ۳/۴۳٪ و در گروه اندانسترون ۳/۳٪ بود که تفاوت فقط بین گروه اندانسترون با پلاسیو از لحاظ آماری معنی دار بود ($P=0/019$). میزان بروز کلی استفراغ در گروه پلاسیو ۷/۵۶٪، در گروه متولوپرامید ۰/۲۰٪ و در گروه اندانسترون ۷/۲۶٪ بود که تفاوت بین گروه پلاسیو با هر دو گروه متولوپرامید ($P=0/007$) و اندانسترون ($P=0/035$) از لحاظ آماری معنی دار بود ولی دو گروه مداخله باهم تفاوت معنی داری نداشتند ($P=0/12$). همچنین دریافت کلی داروی ضد تهوع در گروه اندانسترون (۰/۴٪) نسبت به گروه های متولوپرامید ($P=0/007$) و پلاسیو ($P=0/063$) کمتر بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0/07$).

نتیجه گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که هر دو داروی متولوپرامید و اندانسترون نسبت به پلاسیو در کاهش کلی استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی لپاروسکوپیک موثرند. در مقایسه این دو دارو، میزان اثربخشی اندانسترون در کاهش تهوع بیشتر از متولوپرامید بوده ولی در کاهش استفراغ بعد از عمل تفاوت معنی داری بین این دو دارو مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: اندانسترون؛ متولوپرامید؛ کله سیستکتومی لپاراسکوپیک؛ تهوع و استفراغ بعد از عمل

دریافت: ۹۱/۸/۱۲ پذیرش: ۹۲/۲/۲۸

بدون مداخله پیشگیرانه، تهوع و استفراغ بعد از عمل در حدود یک سوم بیماران (بین ۱۰ تا ۶۰ درصد) تحت بیهوشی عمومی رخ می‌دهد و عواقب آن شامل: باز شدن زخم‌ها، خونریزی، افزایش احتمال آسپیراسیون محتویات معده، تاخیر در ترخیص از ریکاوری، بستری مجدد در بیمارستان بعد از ترخیص

مقدمه

تهوع و استفراغ بعد از عمل از عوارض عمده بیهوشی عمومی می‌باشد که یک مشکل بالینی بعد از بیهوشی و جراحی بوده که باعث تأخیر در ترخیص از بیمارستان می‌شود [۱].

سروتونین در انتهای اعصاب واگ و گیرنده های مرکزی آن در مرکز استفراغ، رفلکس استفراغ را مهار می نماید [۴]. اندانسترون داروی موثری در پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ بعد از عمل با اثرات جانبی کمی می باشد [۵]. عوارض جانبی عمدۀ متوكلوپرامید شامل: کرامپ شکمی، خواب آلودگی، سرگیجه، و بندرت واکنش های دیستونیک اکسترایپرامیدال و آریتمی های قلبی می باشند، در حالی که عوارض جانبی اندانسترون عبارتند از: سردرد، سیکی سر، سرگیجه، فلاشینگ در محل تزریق و آریتمی های قلبی [۶].

جراحی لپاراسکوپیک نسبت به جراحی باز در اعمال جراحی مختلفی ترجیح داده می شود که به دلیل عوارض کمتر و ماهیت کم تهاجمی تر آن است. یکی از کاربردهای عمدۀ لپاراسکوپی در انجام کوله سیستکتومی می باشد که در حال حاضر به دلیل عوارض کمتر به عنوان روش انتخابی درمان کوله سیستیت حاد انتخاب شده است ولی هم چنان عوارض خاص خود از جمله تهوع و استفراغ بعد از عمل را نیز دارد که ما را به سمت شناسایی روشی مناسب جایت کنترل آن سوق می دهد [۶]. همچنین از آنجایی که هدف از لپاراسکوپی کاهش طول مدت بستره بیماران می باشد، اگر بتوانیم تهوع و استفراغ به دنبال کله سیستکتومی لپاروسکوپیک را کنترل نماییم بہتر خواهیم توانست به این هدف نایل شویم. با توجه به مطالب ذکر شده، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات متوكلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی لپاروسکوپیک انجام شد.

روش کار

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، بعد از اخذ تأییدیه کمیته اخلاقی دانشگاه و IRCT201111094093N3 و کسب رضایت نامه کتبی از بیماران، ۹۰ نفر از بیماران ۸۰ تا ۱۵ ساله با

و کاهش رضایت بیمار می باشد. از نظر بیمار، تهوع و استفراغ بعد از عمل می تواند حتی ناراحت کننده تر از درد بعد از عمل باشد [۲]. در اتیولوژی تهوع و استفراغ بعد از عمل چندین فاکتور دخیل بوده و پیشگیری گسترده آن مقرن به صرفه نیست. توانایی مشخص کردن بیماران پرخطر جیت مداخله پیشگیرانه می تواند به طور قابل توجهی کیفیت مراقبت از بیمار و رضایتمندی بعد از عمل را ارتقاء بخشد. در مطالعات مختلف جنس مونث، سابقه قبلی بیماری حرکتی (motion sickness)، سابقه قبلی تهوع و استفراغ بعد از عمل، غیر سیگاری بودن و استفاده از مخدّر های بعد از عمل به عنوان عوامل مستعد کننده برای تهوع و استفراغ بعد از عمل ذکر شده اند [۱].

اقدامات پیشگیرانه برای تهوع و استفراغ بعد از عمل شامل تعديل تکنیک بیهوشی و مداخله دارویی می باشد. اگر چه اقدامات پیشگیرانه جیت جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل بطور مشخص موثرتر از درمان می باشند ولی گروهی از بیماران حتی پس از مداخله پیشگیرانه مناسب، نیازمند درمان بعد از عمل می باشند. در انتخاب داروی مناسب برای پیشگیری از این عارضه دراین بیماران، هم نوع دارو و هم زمان تجویز آن از فاکتورهای حائز اهمیت می باشند. در مطالعات متعددی تأثیر داروهای متداول (متوكلوپرامید، پرفنازین، پروکلرورپرازین، دروبریدول و سیکلزین) و آنتاگونستیبای رسپتور ۵-هیدروکسی تریپتامین (اوندانسترون، دولاسترون، گرانیسترون و تروپیسترون) در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج حاصل از آنها متفاوت و در مواردی متناقض بودند [۳].

ازین این داروها متوكلوپرامید با مهار گیرنده های دوبامین در مرکز گیرنده های شیمیایی بصل النخاع (CTZ) باعث مهار یا کاهش تهوع و استفراغ می شود و اندانسترون با اثرات آنتاگونستی گیرنده های

بیماران در اتاق ریکاوری توسط کارشناس هوشبری که از نوع داروی تجویزی مطلع نبود، از نظر بروز تهوع و استفراغ، تعداد دفعات استفراغ، نیاز به تجویز داروی ضد تهوع، عوامل موثر بر بروز تهوع و استفراغ (سن، جنس، طول مدت عمل، سابقه مصرف سیگار)، نیاز به دریافت داروی مخدر و میزان بروز لرز (Shivering) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین بیماران در ۶ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از عمل نیز از نظر بروز تهوع، استفراغ و نیاز به تجویز داروی ضد تهوع مورد ارزیابی قرار گرفته و برای هر مورد بروز استفراغ و یا ادامه تهوع پیش از ۵ دقیقه داروی متوكلوپرامید mg ۱۰ و ریدی تزریق می شد.

حجم نمونه با احتساب کاهش ۰.۴٪ در میزان بروز تهوع و استفراغ (از ۰.۷٪ به ۰.۴٪) در مطالعات قبلی و میزان $\alpha=0.05$ و $\beta=0.20$ ، به تعداد ۳۰ نفر در هر گروه محاسبه شد.

اطلاعات جمع آوری شده در فرم های از قبیل تنظیم شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ شده و برای مقایسه متغیرهای پیوسته در گروه ها از آزمون آماری آنالیز واریانس (ANOVA) و برای مقایسه متغیرهای کیفی از محدود کای دو استفاده شد. سطح معنی داری آماری کمتر از ۰.۰۵ می باشد.

یافته ها

در مطالعه حاضر بیماران در گروه های مختلف از لحظه ویژگی های دموگرافیک و علایم بالینی پایه ای با هم دیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند (جدول ۱).

میزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل و میزان نیاز به داروی ضد تهوع در اتاق ریکاوری و ۶ و ۲۴ ساعت اول بعد از عمل در جدول ۲ خلاصه شده است.

^۱ASA کلاس I و II کاندید عمل جراحی کله سیستکتومی لپاروسکوپیک در بیمارستان امام خمینی اردبیل انتخاب شدند. معیارهای خروج از مطالعه شامل: ریفلaks گاستروازوفاژیال، چاقی شدید، راه هوایی مشکل دار، حاملگی، شیردهی، بیماری های کبد و کلیه، سابقه اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم و $BMI > 30$. بیماری های عصبی عضلانی، بیماری های روانی، دیابت و انسداد دستگاه گوارشی بودند. بیماران به صورت تصادفی بلوک بندی شده در سه گروه ۳۰ نفره تقسیم شدند و بلافضله قبل از القای بیهوشی، برای بیماران گروه اول ۱۰ میلی گرم متوكلوپرامید (M) و گروه دوم ۴ میلی گرم اندازسترون (O) و گروه کنترل ۲ سی سی نرمال سالین (P) تزریق شد. داروها در سرنگ های یکسان با حجم ۲ سی سی آماده شده و تزریق دارو توسط متخصص بیهوشی که از نوع دارو بی خبر بود انجام شد. برای تمام بیماران میدازولام mg ۲ و ریدی به عنوان پیش دارو تجویز شده، القای بیهوشی هر سه گروه به روشن یکسان با تزریق فنتانیل $\mu\text{g}/\text{kg}$ ، 0.5 mg/kg پروپوفول 2 mg/kg و آتراکوریوم 0.5 mg/kg شروع شده و پس از لوله گذاری تراشه ادامه بیهوشی با انفوزیون پروپوفول $100\text{ }\mu\text{g/kg/min}$ برقرار می گردید. برای حفظ شلی عضلانی در طول عمل جراحی آتراکوریوم 25 mg/kg تزریق شده و بیماران در طول عمل جراحی بصورت مکانیکی تهویه می شدند. در انتهای عمل جراحی تجویز همه داروهای بیهوشی قطع شده و برای بیمار اکسیژن 100 l/min به میزان 6 l/min داده می شد. بدنبال برگشت تنفس خودبخودی، شلی عضلانی با تزریق نئوستیگمین 0.25 mg/kg و آتروپین 0.5 mg/kg برگردانده شده و پس از برقراری تنفس مناسب بیماران اکستوبه شده و به اتاق ریکاوری منتقل شدند.

¹ American Society of Anesthesiologists

² Body Mass Index

جدول ۱. مشخصات بیماران به صورت تعداد (%) یا (میانگین ± انحراف معیار)

F	P-value	(ن=۳۰) پلاسیو	(ن=۳۰) متوكلوپرامید	(ن=۳۰) اندانسترون	متغیرها
حسمیت					
-/۷۷	-/۷۷	۵(۱۶/۷)	۴(۱۳/۳)	۷(۲۳/۴)	مذکر
		۲۵(۸۶/۳)	۲۶(۸۶/۷)	۲۳(۷۶/۷)	مونث
۱/۲۱	-/۳۱	۴۲/۱۷±۱۴/۰۲۷	۴۶/۲۷±۱۵/۱۹۵	۴۵/۹۷±۱۳/۰۶۹	سن (سال)
-/۴۹	-/۶۹	۷۲/۳۳±۱۰/۶۲	۶۹/۹۷±۸/۸۲	۷۲/۴۷±۷/۹۱	وزن (کیلوگرم)
محل سکونت					
-/۲۷	-/۲۷	۲۱(۷۰)	۲۳(۷۶/۷)	۱۶(۵۳/۳)	شیر
		۹(۳۰)	۷(۲۳/۳)	۱۴(۴۶/۷)	روستا
-/۵۶	-/۵۶	۲(۶/۶)	۳(۱۰)	۵(۱۶/۶)	سیگاری بودن
۲/۱۱	-/۱	۷۷±۱۶/۱۲	۷۹/۲۳±۱۳/۴۲	۸۴/۶۷±۱۶/۰۱	طول مدت عمل (دقیقه)
۱/۸۶	-/۱۴	۱۲۶/۱±۱۴/۲۸	۱۳۲/۴۷±۱۱/۴۵	۱۲۸/۵±۱۰/۱۴	فشار خون سیستولیک
۱/۷۲	-/۱۷	۷۷/۹۳±۹/۰۲	۸۱/۴۳±۹/۶۷	۷۷/۱۰±۷/۲۱	فشار خون دیاستولیک
۱/۳۱	-/۲۸	۸۵/۵۳±۱۲/۹۳	۸۲/۲۰±۱۳/۱۷	۸۱/۳۳±۱۲/۸۲	ضریان قلب

جدول ۲. بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل، تعداد (%)

Chi ₂	P-value	(ن=۳۰) پلاسیو	(ن=۳۰) متوكلوپرامید	(ن=۳۰) اندانسترون	پیامد
در ریکاوری					
۱۱/۷۸	-/۰/۰۳	۱۲(۴۰)	۹(۳۰)	۱(۳/۳)	تهوع
۲/۰۳	-/۶	۱(۳/۳)	۱(۳/۳)	-(-)	استفراغ
۶/۹۲	-/۰۳	۶(۲۰)	۶(۲۰)	-(-)	داروی ضد تهوع
در ۶ ساعت اول					
۱۶/۰۵	-/۰/۰۳	۲(۶۶/۷)	۱۳(۴۳/۳)	۷(۲۳/۳)	تهوع
۱۴/۹۷	-/۰/۰۱	۱۷(۵۶/۷)	۵(۱۶/۷)	۶(۲۰)	استفراغ
۸/۲۸	-/۰/۲۸	۱۶(۵۳/۳)	۸(۴۶/۷)	۷(۲۳/۳)	داروی ضد تهوع
در ۶-۲۴ ساعت:					
۲۳/۰۳	-/۰/۰۱	۱۰(۳۳/۳)	-(-)	۳(۱۰)	تهوع
۴/۱۴	-/۳۵	۲(۶/۷)	-(-)	۲(۶/۷)	استفراغ
۱۴/۴	-/۰/۲۱	۷(۲۳/۳)	-(-)	۳(۱۰)	داروی ضد تهوع
بروز کلی تهوع					
۹/۰۲	-/۰/۳	۲(۶۶/۷)	۱۳(۴۳/۳)	۱۰(۳۳/۳)	بروز کلی تهوع
۱۱/۸۶	-/۰/۰۶	۱۷(۵۶/۷)	۶(۲۰)	۸(۲۶/۷)	بروز کلی استفراغ
۷/۴۵	-/۰/۷۶	۲(۶۶/۷)	۱۹(۶۳/۳)	۱۲(۴۰)	نیاز کلی به دارو

از نظر بروز کلی استفراغ بین گروه متوكلوپرامید و پلاسیو ($P=0/007$) همچنین بین گروه اندانسترون و پلاسیو ($P=0/035$) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، که در مقایسه زمانهای مختلف، بروز استفراغ در ریکاوری و ۲۴ ساعت بعد از عمل بین ۳ گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت ($P>0/05$). در حالی که در ۶ ساعت اول بعد از عمل بین گروه متوكلوپرامید و پلاسیو ($P=0/03$) همچنین بین گروه اندانسترون و پلاسیو ($P=0/07$) تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد.

از نظر میزان بروز تهوع در ریکاوری بین گروه اندانسترون و پلاسیو ($P=0/001$) همچنین بین گروه اندانسترون و متوكلوپرامید ($P=0/12$) تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین بروز تهوع در ۶ ساعت اول فقط بین گروه اندانسترون و پلاسیو ($P=0/001$) و در ۲۴ ساعت اول فقط بین گروه متوكلوپرامید و پلاسیو ($P=0/001$) تفاوت آماری معنی داری داشت. از نظر بروز کلی تهوع نیز فقط بین گروه اندانسترون و پلاسیو اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد ($P=0/19$).

سیستکتومی لپاراسکوپیک می باشد. علت تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لپاراسکوپیک پیچیده و چند عاملی بوده و به انواع فاکتورها از قبیل ویژگی های دموگرافیک بیماران، نوع جراحی، تکنیک و نوع داروهای بیهوشی و مراقبت های بعد از عمل جراحی بستگی دارد [۸].

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، بیماران از لحاظ متغیرهای دموگرافیک، مدت عمل و علایم حیاتی پایه ای مشابه بودند.

در بررسی میزان کلی بروز تهوع و استفراغ در بین گروههای سه گانه مشخص شد که میزان بروز تهوع فقط در گروه اندانسترون نسبت به گروه پلاسیو کاهش معنی دار داشته ولی میزان بروز کلی استفراغ در هر دو گروه مداخله نسبت به گروه پلاسیو کاهش یافته بود و بین دو گروه اندانسترون و متوكلوپرامید در این زمینه تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.

در سال ۲۰۰۸ در مطالعه‌ای که گوپتا^۱ و همکاران [۹] بر میزان اثربخشی اندانسترون و متوكلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لپاراسکوپیک انجام دادند میزان بروز این عارضه را ۲۵٪ در گروه اندانسترون و ۹۰٪ در گروه متوكلوپرامید گزارش کردند. همچنین در مطالعه‌ای دیگر که توسط کاکی^۲ و همکاران [۱۰] در سال ۲۰۰۸ بر روی بیماران کاندید کله سیستکتومی لپاروسکوپیک برای بررسی تأثیر اندانسترون و متوكلوپرامید و پلاسیو در جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل انجام شد، نشان داد که میزان بروز این عارضه در گروه متوكلوپرامید و پلاسیو یکسان بوده (۲۸٪) و در گروه اندانسترون پایین تر از دو گروه دیگر بود (۲۰٪) ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود که در مطالعه ما نیز اندانسترون در کاهش تهوع نسبت به متوكلوپرامید موثرتر بود ولی در بررسی

از نظر میزان نیاز به داروی ضد تهوع در ریکاوری بین گروه اندانسترون با پلاسیو ($P=0.24$) و همچنین گروه اندانسترون با متوكلوپرامید ($P=0.24$) تفاوت آماری معنی دار بود. در حالی که در ۶ ساعت بعد از عمل فقط بین گروه اندانسترون و پلاسیو ($P=0.33$) و در ۲۴ ساعت بعد از عمل بین گروه متوكلوپرامید و پلاسیو ($P=0.11$) تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد. در مجموع دریافت کلی داروی ضد تهوع در گروه اندانسترون نسبت به گروه های متوكلوپرامید ($63/3\%$) و پلاسیو ($66/7\%$) کمتر بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0.07$).

در میان بیماران ۵ نفر (۷٪) از گروه اندانسترون، ۳ نفر (۱۰٪) از گروه متوكلوپرامید در مقایسه با ۱۴ نفر (۴۶٪) از گروه پلاسیو در فاصله ۶ ساعت اول بعد از عمل بیش از یکبار استفراغ داشتند که تفاوت بین دو گروه اندانسترون و متوكلوپرامید از نظر آماری معنی دار نبود ($P=0.06$). این تعداد در هر سه گروه در ۲۴ ساعت بعد از عمل نسبت به ۶ ساعت اول کاهش داشته و تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها از نظر تعداد دفعات استفراغ وجود نداشت ($P=0.66$).

از لحاظ میزان بروز لرز بعد از عمل تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد ($P=0.65$).

از لحاظ بررسی تأثیر فاکتورهای مختلف روی تهوع و استفراغ بعد از عمل سیگاری بودن ($P=0.03$) و طول مدت عمل جراحی بیشتر از ۹۰ دقیقه ($P=0.01$) موجب کاهش معنی دار در بروز این عوارض در هر سه گروه شده بود در حالی که تفاوت آماری معنی داری بین بروز این عوارض و جنسیت و سن بیماران در گروه های مختلف مشاهده نشد ($P>0.05$).

بحث

تهوع و استفراغ بعد از عمل از جمله عوارض شایع بیهوشی و جراحی با یک بروز بالا در جراحی کوله

¹ Gupta

² Kaki

معنی دار بوده و نتایج حاصل از این مطالعات با نتایج مطالعه حاضر مشابه بود.

همچنین در مطالعه‌ای که توسط یاسمین^۴ و همکاران [۱۴] در مورد مقایسه اثر اندانسترون و متوكلوپرامید در جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی لپاروسکوپیک انجام شده بود، اثر اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی لپاروسکوپیک بینتر از متوكلوپرامید بود ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود.

در مطالعه حاضر در بررسی تأثیر سابقه مصرف سیگار بر بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل، تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده و سابقه مصرف سیگار موجب کاهش میزان بروز تهوع و استفراغ در گروه‌های مختلف شده بود. که این نتیجه مشابه نتایج حاصل از مطالعات دیگر از جمله مطالعه سیلوا^۵ و همکاران [۱۵] و اسلام^۶ و همکاران [۱] در بررسی فاکتورهای خطر برای تهوع و استفراغ بعد از عمل می‌باشد.

در بررسی کلی بروز تهوع و استفراغ بر اساس جنسیت با اینکه تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف از نظر بروز تهوع و استفراغ وجود نداشت ولی میزان بروز تهوع و استفراغ در جنس مونث بیشتر بود که در منابع مختلف نیز جنس مونث به عنوان یکی از فاکتورهای خطر برای تهوع و استفراغ بعد از عمل شناخته شده است [۱۶].

در برخی منابع شایع بودن میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در افراد جوان ذکر شده است که در مطالعه ما بیماران در چهار گروه سنی مختلف بررسی شدند که هر چند در گروه سنی بالای ۷۰ سال نسبت به گروههای سنی دیگر میزان بروز تهوع و استفراغ کمتر بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار

کل استفراغ، هر دو دارو کاهش معنی داری در میزان استفراغ نشان دادند.

در مطالعه‌ی دیگری که توسط ساندھو^۱ و همکاران [۱۱] در سال ۲۰۰۸ بر روی بیماران تحت عمل کوله سیستکتومی لپاروسکوپیک برای مقایسه اثرات اندانسترون و متوكلوپرامید انجام شد، نشان داد که با وجود پایین بودن میزان تهوع در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل در گروه اندانسترون نسبت به متوكلوپرامید (۰٪ در مقابل ۴۵٪) این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ولی تفاوت آماری معنی داری در میزان بروز استفراغ بعد از عمل در بین گروه‌ها وجود داشت (۲/۵٪ در مقابل ۲۰٪). این نتیجه با نتیجه مطالعه حاضر که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه در کاهش استفراغ بعد از عمل نشان نمی‌دهد مغایرت دارد.

در مطالعه ویلسون^۲ و همکاران [۱۲] که در سال ۲۰۰۱ به بررسی اثرات دو داروی اندانسترون و متوكلوپرامید در مقایسه با پلاسبو در کوله سیستکتومی لپاروسکوپیک پرداخته بودند، تفاوت آماری معنی داری از نظر بروز تهوع در بین دو گروه مداخله وجود نداشت با وجود اینکه هر دو نسبت به پلاسبو موثرتر بودند. از نظر بروز استفراغ هم در هر دو گروه میزان استفراغ نسبت به پلاسبو به طور معنی داری کمتر بود ولی بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (به ترتیب ۴٪ و ۸٪ در مقابل ۲۲٪). همچنین در مطالعه‌ای که توسط کروبوبان^۳ و همکاران [۱۳] در مورد مقایسه اندانسترون و متوكلوپرامید در جلوگیری از تهوع و استفراغ در بیماران تحت عمل جراحی زنان انجام گرفته بود، بروز کلی تهوع و استفراغ در طول مدت ۲۴ ساعت در گروه اندانسترون ۴۷٪ و در گروه متوكلوپرامید ۶۰٪ بود که این تفاوت از لحاظ آماری

⁴ Yeasmeen

⁵ Silva

⁶ Islam

¹ Sandhu

² Wilson

³ Krobbaaban

اثربخشی اندازترون در کاهش تهوع بیشتر از متوكلوپرامید بوده ولی در کاهش استفراغ بعد از عمل تفاوت معنی داری بین این دو دارو مشاهده نشد.

نبود. اگر چه اکثر مطالعات دیگر تأیید کننده بروز کم تهوع و استفراغ در افراد با سنین بالا می باشد [1]. محدودیت مطالعه حاضر عدم بررسی و مقایسه عوارض جانبی شایع اندازترون و متوكلوپرامید می باشد.

تقدیر و تشکر

لازمست از کادر اطاق عمل و ریکاوری و مخصوصاً آقای فرشید امیری مسئول محترم اطاق عمل بیمارستان امام خمینی اردبیل که در انجام مطالعه مذکور نهایت همکاری را داشتند تشکر نمایم.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان می دهد که هر دو داروی متوكلوپرامید و اندازترون نسبت به پلاسبو در کاهش کلی استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی لپاروسکوپیک موثرند. در مقایسه این دو دارو، میزان

References

- 1- Islam S, Jain PN. Post-operative nausea and vomiting (PONV): A Review Article. Indian J Anaesth. 2004 Nov; 48(4): 253-258.
- 2- Entezariasl M, Khoshbaten M, Isazadehfar K, Akhavanakbari G. Efficacy of metoclopramide and dexamethasone for postoperative nausea and vomiting: a double-blind clinical trial. East Mediterr Health J. 2010 Mar; 16(3): 300-3.
- 3- Loewen PS, Marra CA, Zed PJ. 5-HT3 receptor antagonists vs traditional agents for the prophylaxis of postoperative nausea and vomiting. Can J Anaesth. 2000 Oct; 47(10): 1008-1018.
- 4- Ku CM, Ong BC. Postoperative nausea and vomiting: a review of current literature. Singapore Med J. 2003 Jul; 44(7): 366-74.
- 5- Habib AS, Gan TJ. Evidence-based management of postoperative nausea and vomiting: a review. Can J Anaesth. 2004 Apr; 51(4): 326-41.
- 6- Park A, Lee G, Seagull FJ, Meenaghan N, Dexter D. Patients benefit while surgeons suffer: an impending epidemic. J Am Coll Surg. 2010 Mar; 210(3): 306-13.
- 7- Sarkar M, Pawar A, Dewoolkar L, Charan S. Comparative study of single dose intravenous ondansetron and metoclopramide as premedication for prevention of postoperative nausea and vomiting in obstetrical laparoscopic surgery under general anesthesia. The Internet Journal of Anaesthesiology. 2007; 13(2). Available from: URL:<http://www.ispub.com/journal>.
- 8- Okasho Y, Okutani R, Tsujikawa S, Okutani H, Kinishi Y, Oda Y. Incidence of PONV occurrence related to anesthesia and airway management in patients undergoing mastectomy: 1AP4-5. E J A. 2012 June; 29(50): 14.
- 9- Gupta V, Wakhloo R, Lahori VU, Mahajan MK, Gupta SD. Prophylactic Antiemetic Therapy with Ondansetron, Granisetron and Metoclopramide in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Under General Anaesthesia. Internet J Anesthesiol. 2007; 14(1): 5. Available from: URL: <http://www.ispub.com/journal>.
- 10- Kaki MA, EL-Hakeem EE. Prophylaxis of postoperative nausea and vomiting with ondansetron, metoclopramide or placebo in total intravenous anesthesia patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Saudi Med J. 2008 Oct; 29(10): 1408-13.
- 11- Sandhu T, Tanvatcharaphan P, Cheunjongkolkul V. Ondansetron versus metoclopramide in prophylaxis of nausea and vomiting for laparoscopic cholecystectomy: a prospective double-blind randomized study. Asian J Surg. 2008 Apr; 31(2): 50-54.

- 12- Wilson EB, Bass CS, Abrameit W, Roberson R, Smith RW. Metoclopramide versus ondansetron in prophylaxis of nausea and vomiting for laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg. 2001 Feb; 181(2): 138-41.
- 13- Krobbuaban B, Pitakpol S, Diregpoke S. Ondansetron vs. metoclopramide for the prevention of nausea and vomiting after gynecologic surgery. J Med Assoc Thai. 2008 May; 91(5): 669-74.
- 14- Yeasmeen S, Yasmin R, Akhtaruzzaman A, Shahera Khatun U. Intravenous Granisetron, Ondansetron and Metoclopramide in the Prevention and Treatment of Post Operative Nausea and Vomiting after Laparoscopic Cholecystectomy - A Comparative Study. Journal of BSA. 2006; 19(1-2): 20-27.
- 15- Silva AC, O'Ryan F, Poor DB. Postoperative nausea and vomiting (PONV) after orthognathic surgery: a retrospective study and literature review. J Oral Maxillofac Surg. 2006 Sep; 64(9): 1385-97.
- 16- Kushwaha B, Chakraborty A, Agarwal J, Malick A, Bhushan S, Bhattacharya P. Comparative study of granisetron and ondansetron alone and their combination with dexamethasone, for prevention of PONV in middle ear surgery . Internet J Anesthesiol. 2007; 13(2). Available from: URL: <http://www.ispub.com/journal>.