

مقایسه اثر میدازولام و لیدوکائین بر ری پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه

دکتر قدرت اخوان اکبری^۱، دکتر عبدالرسول حیدری^۲، دکتر شکوه صدر عضدی^۳

چکیده

زمینه و هدف: لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه می تواند باعث تاکیکاردی، افزایش فشار خون و دیس ریتمی و ایسکمی میوکد شود. در این مطالعه تاثیر میدازولام و لیدوکائین بر پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه بررسی شده است.

روش کار: در این مطالعه، ۵۲ بیمار کلاس یک (ASA) (American Society of Anesthesia)، در سنین ۳۰-۶۰ سال و ۶۰-۸۰ کیلوگرم عمل جن انتخابی فتق اینگوینال با بیهوشی عمومی، بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. برای تمامی بیماران سرم نرمال ۵-۱۰ ml/kg) با رینگر (۵-۱۰ دقیقه قبل از القای بیهوشی تجویز شد و سپس بیماران بمدت سه دقیقه پره اکسیژنه شدند. گروه یک، میدازولام (۰/۰۵ mg/kg) و گروه دو لیدوکائین (۱/۵ mg/kg) سه دقیقه قبل از لوله گذاری تراشه دریافت کردند. القای بیهوشی با پروپوفول (۱۰۰ μg) و تیوپنتال (۵ mg/kg) داده شد و لوله گذاری تراشه به کمک ساکسینیل کولین (۲ mg/kg) صورت گرفت. حفظ بیهوشی با هالوتان (۰/۷۵-۰/۵ درصد) و نسبت های مساوی از نیتروس اکساید و اکسیژن بر قرار گردید. فشار خون سیستولیک، دیاستولیک، فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب قبل از پیش داروها (میدازولام و لیدوکائین)، لوله گذاری و دو و پنج دقیقه پس از لوله گذاری اندازه گیری و ثبت شد. سپس با استفاده از آزمون تی زوج و نرم افزار SPSS و تحلیل داده ها صورت گرفت.

نتایج: فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب پس از لوله گذاری تراشه در دو گروه بت به مقادیر پایه افزایش یافت. اختلاف افزایش فشار خون دیاستولیک و فشار متوسط شریانی بین دو گروه معنی دار بود ($p < 0/05$). ولی اختلاف افزایش فشار خون سیستولیک و ضربان قلب بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. افزایش فشار خون دیاستولیک و فشار متوسط شریانی بصورمعنی داری در گروه یک بیشتر از گروه دو بود ($p < 0/05$).

نتیجه گیری: میدازولام از نظر بالینی به اندازه لیدوکائین در کنترل پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه موثر بود بنابراین می توان از آن به عنوان جایگزین لیدوکائین در لوله گذاری تراشه استفاده نمود و از مزایای ایجاد فراموشی، ضد اضطراب و بی قراری آن بهره مند شد.

واژه ها کلیدی: میدازولام، لیدوکائین، لوله گذاری تراشه، همودینامیک

Taittonen

$$\text{MAP} = \frac{\text{فشار خون دیاستولیک} \times 2 + \text{فشار خون سیستولیک}}{3}$$

1- Mean Arterial Pressure

اگر چه فشار خون و ضربان قلب در دو گروه پس از لوله گذاری نسبت به زمان پایه افزایش یافت ولی اختلاف فشار خون سیستولیک و ضربان قلب بین دو گروه معنی دار نبود، در عین حال در این مطالعه معلوم شد که اختلاف فشار خون دیاستولیک و فشار متوسط شریانی بین دو گروه معنی دار می باشد ($p < 0.05$).

جدول شماره ۱. مقایسه میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولیک بین دو گروه دارویی میدازولام و لیدوکائین

گروه دارویی	میدازولام		لیدوکائین		معنی داری
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	
قبل از شروع درمان	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
قبل از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
بعد از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
دو دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
پنج دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱

جدول شماره ۲. مقایسه میانگین و انحراف معیار فشار خون دیاستولیک بین دو گروه دارویی میدازولام و لیدوکائین

گروه دارویی	میدازولام		لیدوکائین		معنی داری
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	
قبل از شروع درمان	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱
قبل از لوله گذاری	۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
بعد از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
دو دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
پنج دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱

جدول شماره ۳. مقایسه میانگین و انحراف معیار فشار متوسط شریانی بین دو گروه دارویی میدازولام و لیدوکائین

گروه دارویی	میدازولام		لیدوکائین		معنی داری
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	
قبل از شروع درمان	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
قبل از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
بعد از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
دو دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
پنج دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱

جدول شماره ۴. مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب بین دو گروه دارویی میدازولام و لیدوکائین

گروه دارویی	میدازولام		لیدوکائین		معنی داری
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	
قبل از شروع درمان	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
قبل از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
بعد از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
دو دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱
پنج دقیقه پس از لوله گذاری	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱/۱۱	۱/۱۱۱

□ □

در این مطالعه اثرات میدازولام و لیدوکائین در کنترل پاسخ همودینامیک لوله گذاری تراشه در بیماران کلاس یک ASA مشاهده شدند. مقادیر پایه فشار خون سیستولیک، دیاستولیک، فشار متوسط شریانی و ضربان قلب در دو گروه مشابه بود و تفاوت معنی داری نداشت. پس از لوله گذاری تراشه پارامترهای همودینامیک فوق در هر دو گروه افزایش یافت که میزان افزایش ضربان قلبیشتتر بود. در مطالعه تایتون و همکاران نیز معیای همودینامیک پس از لوله گذاری تراشه افزایش یافت که میزان افزایش ضربان قلب بیشتر بود [۸]. در مطالعه زنگ اثرات میدازولام و فنوباریتال سدیم بعنوان پیش دارو بر روی پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه پس از القای بیهوشی با پروپوفول مقه شد، که در گروه میدازولام فشار خون پس از لوله گذاری تراشه بدون تغییر بود و تغییر ضربان قلب در این گروه کمتر دبد □ □ ($p < 0/00$) [۹].

در مطالعه نیشیاما و همکاران، القای بیهوشی با میدازولام و تیوپنتال سدیم در گبه اول و تیوپنتال سدیم در گروه دوم انجام شد. فشار خون و ضربان قلب پس از لوله گذاری در هر دو گروه افزایش یافت ولی این افزایش در گروه دوم بطور معنی داری بیشتر بود [۱۰].

در مطالعه استولتینگ نشان داده شده است که لیدوکائین وریدی باعث کاهش پاسخ های فشار خون و ضربان قلب در موقع لارنگوسکوپی آناه مدت بیماران می گردد [۱۱].

در مطالعه لویت^۱ و همکاران، کارآیی لیدوکائین و اسمولول در کاهش پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه در بیماران با ترومای سر برر □ □ □. در ۳

بیمار با ترومای سر، لیدوکائین و اسمولول باعث کاهش پاسخ همودینامیک به لوله گذاری تراشه گردید [۱۲]. در مطالعه حاضر اختلاف فشار خون سیستولیک و ضربان قلب از نظر آماری بین دو گروه معنی دار نبود ولی اختلاف فشار خون دیاستولیک و فشار متوسط شریانی از نظر آماری بین دو گروه معنی دار بود ($p < 0/05$) و مشخص گردید که افزایش در گروه میدازولام بیشتر بوده است.

در مطالعه تایتون و همکاران، اختلاف فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب بین دو گروه دارویی میدازولام و کلونیدین از نظر آماری معنی دار نبود و مشخص گردید میدازولام به اندازه کلونیدین موثر بوده است [۱۳].

در مطالعه زنگ و همکاران، اضافه کردن میدازولام بعنوان پره مدیکاسیون در مقایسه با فنوباریتال سدیم، از نظر آماری بصورت معنی دار باعث ایجاد ثبات همودینامیک پس از لوله گذاری گردید ($p < 0/00$) [۱۴].

در مطالعه نیشیاما و همکاران، اختلاف فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب بین دو گروه دارویی، معنی دار بود و میدازولام بصورت معنی داری باعث جلوگیری از افزایش فشار خون و ضربان قلب پس از لوله گذاری گردید ($p < 0/00$) [۱۵].

در مطالعه لویت و همکاران، دو داروی لیدوکائین و اسمولول با هم مقایسه شدند و مشخص گردید که اختلاف فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب از نظر آماری بین دو گروه معنی دار نبود و لیدوکائین هم به اندازه اسمولول در جلوگیری از پاسخ فشاری به لوله گذاری موثر بود [۱۶].

اگر چه در مطالعه حاضر، اختلاف افزایش فشار خون دیاستولیک بین دو گروه دارویی حدود ۳٪ و در مورد فشار متوسط شریانی ۲٪ بوده است، ولی این اختلاف از نظر بالینی تاثیر زیادی نداشته و می توان از میدازولام

10-Kobayashi TL. Lack of effects of i.v. lidocaine on cardiovascular responses to laryngoscopy and intubation. *Masui*. 1995 Apr; 44(4): 579-82.

11- Zeng WA, Wang J, Lin WQ. Effects of midazolam premedication on induction doses of propofol and hemodynamic changes during tumor patient induction. *Ai Zheng*. 2002 Jun; 21(6): 678-80.

12- Nishiyama T, Misawa K, Yokoyama T. Effect of combining midazolam and barbiturate on the response to tracheal intubation: changes in autonomic nervous system. *J Clin Anesth*. 2002 Aug; 14(5): 344-8.

13- Levitt MA, Dresden GM. The efficacy of esmolol versus lidocaine to attenuate the hemodynamic response to intubation in isolated head trauma patients. *Acad Emerg Med*. 2001 Jan; 8(1): 19-24.

14- Lev R, Rosen P. Prophylactic lidocaine use preintubation. *J Emerg Med*. 1994 Jan-Feb; 12(4): 499-506.

بعنوان جایگزین لیدوکائین بعنوان پیش دارو برای جلوگیری از تحریک سمپاتیک در موقع لوله گذاری تراشه استفاده نمود و از مزایای دیگر این دارو مثل رفع اضطراب، بی قراری و ایجاد فراموشی نیز بهره مند □□

□□□□

1- Kovac AL. Controlling the hemodynamic response to laryngoscopy and endotracheal intubation. *J Clin Anesth*. 1996 Feb; 8(8): 63-79.

2- Crawford DC, Fell D, Achola KJ, Smith G. Effect of alfentanil on the pressor and catecholamine responses to tracheal intubation. *Br J Anaesth*. 1987 Jun; 59(6): 707-12.

3- Stoelting RK. Attenuation of blood pressure response to laryngoscopy and tracheal intubation with sodium nitropruside. *Anesth Analg*. 1979 Mar-Apr; 58(2): 116-9.

4-Vucevic M, Purdy GM, Ellis FR. Esmolol hydrochloride for the management of the cardiovascular stress response to laryngoscopy and tracheal intubation. *Br J Anaesth*. 1992 May; 68(5): 529-30.

5-Bedford RF, Marshall WK. Cardiovascular responses to endotracheal intubation during four anesthetic techniques. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1984 Oct; 28(2): 563-6.

6- Stoelting RK. Blood pressure and heart rate changes during short duration laryngoscopy for tracheal intubation: Influence of viscous intravenous lidocaine. *Anesth Analg*. 1978 Mar-Apr; 57(2): 197.

7-Curran J, Crowley M, O'Sullivan G. Droperidol and endotracheal intubation. *Anaesthesia*. 1980 Mar; 35(3): 290-4.

8-Taittonen M, Kirvela O, Aantaa Ratal. Cardiovascular and metabolic response to clonidine and midazolam premedication. *Eur J Anaesth*. 1997 Mar; 14(2):190-6.

9- Reves JG, Fragen RJ, Vinik HR. Midazolam pharmacology and uses. *Anesthesiol*. 1985 Mar; 62(3): 310-24.